

[2018년 4월 15일 시행]
임상심리사2급 제1회 실기 기출문제

1. 로샤(Rorschach)검사의 특수점수에서 특수내용의 종류를 3가지만 쓰고 각각에 대해 설명하시오. (6점)
2. 재활모형에서 기본이 되는 손상, 장애, 핸디캡의 의미를 쓰고 개입방법의 차이를 설명하시오. (6점)
3. 해결중심 가족치료에서 주로 사용하는 질문의 유형 중 3가지를 쓰고 설명하시오. (6점)
4. 다음은 철수에 대한 KEDI-WISC 프로파일이다. 이를 토대로 임상심리사가 할 수 있는 자문이나 치료적 개입에 대한 조언을 5가지 기술하시오. (6점)

하위검사명	평가치	하위검사명	평가치
상식	3	빠진 곳 찾기	6
공통성	8	기호쓰기	6
산수	4	차례 맞추기	6
어휘	9	토막 짜기	9
이해	9	모양 맞추기	8
숫자(보충)	6	미로(보충)	7

5. 지능을 평가할 때의 주요 쟁점인 '임상적 접근'과 '개념적 접근'에 대해 설명하시오. (6점)
6. 윤리기준에서 이중관계(다중관계)의 의미와 피해야 하는 이유를 예를 들어 설명하시오. (5점)

7. 집단치료에서 집단구성시 현실적으로 고려해야하는 사항 5가지를 쓰시오. (5점)

8. 공포증환자 대상으로 체계적 둔감화를 통해 치료할 경우 그 절차를 3단계로 구분하여 순서대로 설명하시오. (6점)

9. 정신과병동에 입원해있는 A씨는 만성조현병 환자이다. 임상심리사는 이 환자에게 인사하는 기술을 가르치고자 한다. 이를 위해 토큰경제방법을 사용하고 방법은 5단계로 구분하여 순서대로 설명하시오. (5점)

10. 벡(Beck)이 설명하는 인지적 왜곡의 종류 6가지를 쓰고, 각각에 대해 설명하시오. (6점)

11. 알롬(Yalom)이 제시한 집단 상담의 치료 5가지를 쓰시오. (5점)

12. 와이너(Weiner)는 객관적 검사와 투사적 검사의 구분에서 로샤(Rorschach)검사를 투사적 검사로 분류하는 것에 대해 이의를 제기하였다. 그 이유를 2가지만 쓰시오. (4점)

13. 인간중심치료에서 로저스(Rogers)가 제시한 긍정적인 성격변화를 위한 필요충분조건 5가지를 쓰시오. (5점)

14. TCI의 척도를 구성하는 4가지 기질차원과 3가지 성격차원을 설명하시오. (7점)

15. 다음 사례를 읽고 아래 질문에 답하시오. (6점)

고등학생인 A양은 주위에서 말랐다고 하는데 자신은 뚱뚱하다고 생각하고, 먹지 않아서 신체적으로 어지러운 증상을 호소하면서도 자신의 말라가는 모습을 보며 만족하고 있다.

질문) 위 사례에 대한 진단명 및 진단기준을 쓰시오.

16. 다음 사례를 읽고 아래 질문에 답하시오. (6점)

충남 천안시에 사는 B씨는 올해 35세로 가정주부이다. B씨는 최근 1개월 동안 잠을 제대로 이루지 못하여 피로를 느끼며, 생활의 활기를 잃은 상태이다. 또한 자신이 가정 문제를 해결하는 데 있어서 아무런 능력을 발휘할 수 없음에 대한 무기력감과 죄책감에 휩싸여 있으며, 자신의 인생과 미래에 대해 심각하게 고민하고 있다. A씨는 자살에 대해 생각한 적이 있으며, 자기 자신이 현재 우울증을 가지고 있다고 판단하고 있다.

- 1) 우울장애에 대한 진단기준을 4가지만 쓰시오.
- 2) 내담자가 자살위험이 있는지 알아보기 위한 평가내용 3가지를 쓰시오.
- 3) 내담자가 자살위험이 높을 때 조치방법 3가지를 쓰시오.

17. 일반적으로 단기 상담이 적합한 내담자의 특징 4가지를 쓰시오. (4점)

18. 어떤 환자에게 MMPI를 실시한 결과 L, K가 70이 넘어 방어적 경향이 강한 것으로 나타났고 검사 결과를 해석 할 수 없는 정도였다. 그러나 이 사람에게 심리검사는 꼭 필요한 것으로 판단되었다. 이 때 임상심리사가 취할 수 있는 방법을 2가지로 구분해서 설명하시오. (6점)